

## Baccalauréat Asie ES 16 juin 2009

### Exercice 1

5 points

Commun à tous les candidats

Le tableau ci-dessous donne le prix du kilogramme de pain dans un quartier d'une grande ville depuis 2001 (les prix sont relevés au premier janvier).

Année	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Rang $x_i$	1	2	3	4	5	6
Prix $y_i$ du kilogramme de pain en euro	1,90	1,94	2,01	2,07	2,13	2,16

- Calculer le pourcentage d'évolution du prix du kilogramme de pain dans ce quartier entre les années 2000 et 2005. On donnera une valeur arrondie au centième.
- Représenter le nuage de points associé à la série  $(x_i ; y_i)$  dans un repère du plan.
  - Pourquoi un ajustement affine du nuage de points est-il justifié ?
  - Déterminer une équation de la droite  $(D)$  d'ajustement affine de  $y$  en  $x$  obtenue par méthode des moindres carrés. Les coefficients seront arrondis à  $10^{-3}$  près.
  - Représenter la droite  $(D)$  dans le repère précédent,
  - En admettant que le modèle précédent est valable pour les années suivantes, calculer le prix du kilogramme de pain dans ce quartier en 2010 (valeur arrondie au centième).
- On considère maintenant un autre modèle pour étudier l'évolution du prix du kilogramme de pain dans ce quartier. Les relevés de prix entre 2005 et 2008 ont permis de constater que le prix du kilogramme de pain a augmenté de 1,5 % par an.  
En admettant que le prix du kilogramme de pain continue d'augmenter chaque année de 1,5 % calculer le prix du kilogramme de pain dans ce quartier en 2010 (valeur arrondie au centième).
- Pour chacun des modèles précédents, déterminer à partir de quelle année le prix du kilogramme de pain dans ce quartier dépassera 2,60 euros.

### Exercice 2

5 points

Candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité

Une association propose à ses adhérents une sortie payante, Les adhérents peuvent choisir d'emporter leur pique-nique ou de payer à l'association un supplément pour le repas. Le tableau ci-dessous donne les différents tarifs suivant l'âge des adhérents.

catégorie	A : adultes (plus de 18 ans)	B : jeunes de 10 à 18 ans	C : enfants de moins de 10 ans
prix de la sortie	20 €	15 €	8 €
prix du repas	6 €	5 €	3 €

L'association a inscrit 87 participants pour cette sortie, dont 58 adultes et 12 enfants de moins de 10 ans. La moitié des adultes, un quart des enfants de moins de 10 ans et 10 jeunes de 10 à 18 ans ont emmené leur pique-nique.

On choisit un participant au hasard, et on note :

- $A$  l'évènement « le participant fait partie de la catégorie A » ;
- $B$  l'évènement « le participant fait partie de la catégorie B » ;
- $C$  l'évènement « le participant fait partie de la catégorie C » ;
- $R$  l'évènement « le participant choisit le repas proposé par l'association ».

- Représenter la situation à l'aide d'un arbre pondéré, qui sera complété au cours de la résolution de l'exercice.
- Calculer la probabilité de l'évènement  $B$ .

- b. Calculer la probabilité de l'évènement  $R \cap A$ .
  - c. Montrer que la probabilité de l'évènement  $R$  est égale à  $\frac{15}{29}$ .
  - d. Sachant que le participant choisi a pris le repas proposé par l'association, quelle est la probabilité que ce participant soit un adulte ?
3. On note  $X$  le prix payé à l'association par un participant,
- a. Déterminer les différentes valeurs que peut prendre le prix  $X$ .
  - b. Établir la loi de probabilité du prix  $X$ .

**Exercice 3****5 points****Commun à tous les candidats**

Pour chacune des questions de ce QCM, une seule des quatre propositions a, b, c ou d est exacte. Le candidat indiquera sur sa copie le numéro de la question et la lettre correspondant à la réponse choisie. Aucune justification n'est demandée.

*Une réponse exacte rapporte un point. Une réponse inexacte ou une absence de réponse n'enlève aucun point.*

1. Une ville en pleine expansion a vu sa population augmenter de 20 % pendant quatre années consécutives, puis de 7 % durant chacune des cinq années suivantes, et enfin de 6 % la dixième et dernière année. Le taux d'augmentation annuel moyen (arrondi au dixième) durant la décennie qui vient de s'écouler s'élève à :
  - a. 33,0 %
  - b. 12,1 %
  - c. 11,9 %
  - d. 11,0 %
2. La population de la ville voisine a diminué de 5 % en 2008. Quel pourcentage d'augmentation (arrondi au dixième) devrait-elle connaître en 2009 pour que le nombre d'habitants le 1<sup>er</sup> janvier 2010 soit égal au nombre d'habitants à la date du 1<sup>er</sup> janvier 2008 ?
  - a. 10,0 %
  - b. 5,3 %
  - c. 5,0 %
  - d. 4,7 %
3. Le double du logarithme d'un nombre est égal au logarithme de la moitié de ce nombre. Quel est ce nombre ?
  - a. -1
  - b. 0
  - c. 0,5
  - d. 2
4. Une telle fonction  $f$  définie et dérivable sur l'intervalle  $[0; +\infty[$ , est strictement croissante sur l'intervalle  $[0; 5]$  et strictement décroissante sur l'intervalle  $[5; +\infty[$ . Sa courbe représentative  $C$  dans un repère du plan admet une tangente  $\mathcal{T}$  au point d'abscisse 6. Laquelle des équations suivantes est celle de la tangente  $\mathcal{T}$ .
  - a.  $y = -3x + 3$
  - b.  $y = x$
  - c.  $y = 6x - 36$
  - d.  $x = 6$

**Exercice 4****6 points****Commun à tous les candidats**On considère les fonctions  $f$  et  $g$  définies sur l'intervalle  $[0; +\infty[$  par :

$$f(x) = (7-x)e^{x-4} \quad \text{et} \quad g(x) = 2\ln\left(\frac{x+5}{x+1}\right).$$

**Partie A : Étude des fonctions  $f$  et  $g$ .**

1. a. Déterminer la limite de la fonction  $f$  en  $+\infty$ .
- b. Montrer que, pour tout nombre réel  $x$  de l'intervalle  $[0; +\infty[$  on a

$$f'(x) = (6-x)e^{x-4}.$$

- c. Étudier les variations de la fonction  $f$  sur l'intervalle  $[0; +\infty[$  et établir son tableau de variations.
2. a. Soit  $h$  la fonction définie sur  $] -\infty; -1[ \cup ] -1; +\infty[$  par :


$$h(x) = \frac{x+5}{x+1}$$

Le tableau de variations de la fonction  $h$  est donné ci dessous :

$x$	$-\infty$	$-1$	$+\infty$
$h'(x)$	-		-
$h(x)$	1	$+\infty$	1

Déterminer, en le justifiant, le sens de variation de la fonction  $g$  sur l'intervalle  $[0; +\infty[$ 

- b. Déterminer la limite de la fonction  $g$  en  $+\infty$ . Quelle en est la conséquence graphique ?
3. Les courbes représentatives des fonctions  $f$  et  $g$  sont données dans le repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  ci-dessous



- a. Laquelle de ces deux fonctions est représentée par la courbe  $C_1$  ?
- b. Déterminer graphiquement une valeur approchée arrondie à l'unité des solutions de l'équation  $f(x) = g(x)$  sur l'intervalle  $[0 ; +\infty[$ .
- c. Dans cette question, toute tentative d'explication de la démarche 011 de la méthode utilisée sera valorisée.

Le professeur a demandé à Perrine et Elliot de calculer  $\int_0^3 f(x) dx$ .

Voici des extraits de leurs productions :

*Production de Perrine :*

Une primitive de  $f$  est  $F$  telle que  $F(x) = (8 - x)e^{x-4}$ , donc  $\int_0^3 f(x) dx = 5e^{-1} - 8e^{-4} \approx 1,69$ .

*Production d'Elliot :*

Une primitive de  $f$  est  $F$  telle que  $F(x) = \left(7x - \frac{1}{2}x^2\right)e^{x-4}$ , donc  $\int_0^3 f(x) dx = 16,5e^{-1} \approx 6,07$ .

Lors de la correction, le professeur indique que l'un des deux s'est trompé. Est-ce Perrine ou Elliot ? Justifier le choix.

### Partie B : Application économique

Sur l'intervalle  $[0 ; 5]$ , la fonction  $f$  modélise la fonction d'offre des producteurs d'un certain produit et la fonction  $g$  modélise la fonction de demande des consommateurs pour ce même produit. La quantité  $x$  est exprimée en millier de tonnes et le prix  $f(x)$  ou  $g(x)$  est en euro par kg. On rappelle que le prix d'équilibre est le prix qui se forme sur le marché lorsque l'offre est égale à la demande. La quantité d'équilibre est la quantité associée au prix d'équilibre.

Par lecture graphique, donner une valeur approchée de la quantité d'équilibre  $x_0$ , ainsi qu'une valeur approchée du prix d'équilibre  $y_0$ .